



РЕЄСТРАЦІЙНЕ ПОСВІДЧЕННЯ REGISTRATION CERTIFICATE

Відповідно до Закону України «Про ветеринарну медицину», постанови Кабінету Міністрів України від 21.11.2007 р. № 1349 «Про затвердження положень про державну реєстрацію ветеринарних препаратів, кормових добавок, преміксів та готових кормів» та на підставі експертного висновку 14.12.2022 № 273-К/06, рекомендацій Державної фармакологічної комісії ветеринарної медицини, наказу Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів 21.12.2022 № 591 зареєстровано:

продукт Больфо™ нашийник

форма Нашийник

Власник реєстраційного посвідчення:

Еланко ГмбХ

Хайнц-Ломан-Штр. 4, 27472 Куксхафен, НІМЕЧЧИНА

зареєстровано в Україні за № АА-01005-03-10 від 21.12.2022

Виробник:

КВП Фарма і Ветеринар-Продукт ГмбХ

Просендорфер стр. 324, 24106 Кіль, НІМЕЧЧИНА

При будь-якій зміні в реєстраційному досьє власник посвідчення (виробник) повинен повідомити орган реєстрації.

Обов'язкові додатки:

- коротка характеристика препарату (додаток 1);
- листівка-вкладка препарату (додаток 2);
- етикетка (додаток 3).

Реєстраційне посвідчення дійсне до: 29.09.2025

Це посвідчення не є зобов'язанням щодо закупівлі даного продукту.



21.12.2022

Коротка характеристика препарату

1. Назва

БольфоTM нашийник

2. Склад

10,0 г (g) маси нашийника (поліхлорвінілова стрічка) містять діючу речовину:
пропоксур - 0,98 г (g).

Допоміжні речовини: поліхлорвінілова стрічка (дібутил адіпат, пропіленгліколь октаноат деканат, епоксидована сосва олія, стеаринова кислота, діоксид титану, гідрат оксиду заліза, оксид заліза (ІІ), оксид заліза (ІІ, ІІІ), полівінілхлорид).

3. Фармацевтична форма

Нашийник.

4. Фармакологічні властивості

ATCvet QP53, ектопаразитициди, інсектициди і репеленти (QP53AE02, пропоксур)

Діюча речовина препарату, пропоксур, діє на ектопаразитів як контактна отрута, викликаючи токсичну акумуляцію нейрогормону ацетилхоліну на холінергічних нервових закінченнях, внаслідок чого наступає їх загибель (бліх, кліщів, вогнів та ін.). Для ссавців пропоксур нетоксичний.

5. Клінічні особливості

5.1 Вид тварині

Собаки, коти.

5.2 Показання до застосування

Профілактика та лікування собак та котів при ектопаразитарних захворюваннях, викликаних блохами (*Ctenocephalides spp.*) і кліщами (*Ixodidae ricinus*).

5.3 Протипоказання

Не застосовувати хворим і ослабленим тваринам, а також тваринам чутливим до складників препарату!

Не застосовувати тваринам із захворюваннями шкіри та ушкодженнями шкірного покриву!

Не застосовувати кошенятам на цуценятам до 3 місячного віку!

5.4 Побічна дія

Іноді у тварин з підвищеною чутливістю до пропоксуру можливе виникнення ознак подразнення шкіри (почервоніння, свербіж) у перші дні застосування нашийника. При виникненні таких ознак нашийник знімають.

При випадковому попаданні пропоксуру (ДР) у травний канал тварини можливі такі симптоми побічної дії, як салівація, міоз, блювота, діарея. У таких випадках необхідно звернутися до лікаря ветеринарної медицини.

5.5 Особливі застереження при використанні

Немас.

5.6 Використання під час вагітності, лактації, несучості

Не використовувати нашийник самкам в останні тижні вагітності та під час лактації!

5.7 Взаємодія з іншими засобами та інші форми взаємодії

Не застосовувати одночасно з іншими інсектицидами або акарицидами!

5.8 Дози і способи введення тваринам різного віку

На тварину застосовують один нашийник. Відкривають упакування, нашийник розгортають, видаляють тонкі пластикові перегородки на внутрішній стороні і фіксують на шиї тварини таким чином, щоб між шисю та нашийником залишався невеликий проміжок (у два пальці). Нашийник повинен бути вільним на шиї і не стримувати росту тварини. Підігнаний належним чином нашийник у закріпленаому стані повинен вільно рухатися. У перші кілька днів перевіряйте стан шкіри тварини в області шиї і чи нашийник правильно зафікований (чи не за туго закріплений). Для великих собак – нашийник довжиною 66 см (вага 45г) і вмістом пропоксуру 4,442 г. Для котів та малих собак – нашийник довжиною 35 см (вага 12,5 г) і вмістом пропоксуру 1,23 г.

21.12.2022

Постійне використання нашийника забезпечує захист тварини від бліх до 4 місяців, від кліщів до - 10 тижнів.

Ефективність дії нашийника та тривалість захисту залежать від довжини та стану шерсті, інтенсивності інвазії. Тварин зі скуйовджею та брудною шерстю перед застосуванням нашийника купают із шампунем. Рекомендують періодично обробляти підстилки та засоби догляду за тваринами інсектицидним аерозолем БольфоTM.

БольфоTM нашийник застосовують тваринам з 3 місячного віку.

5.9 Передозування (симптоми, невідкладні заходи, антидоти)

БольфоTM нашийник не викликає шкірно-подразнюючої і резорбтивно-токсичної дії.

При передозуванні рекомендованої дози пропоксуре вдвічі симптомів передозування у тварин не спостерігали.

При підвищенні індивідуальній чутливості тварини до пропоксуре і появи ознак подразнення шкіри нашийник знімають.

Антидот: атропіну сульфат.

5.10 Спеціальні застереження

Перед купанням тварини нашийник знімають і одягають після повного висихання шкірного покриву. Часте намокання нашийника знижує його ефективність.

5.11 Період виведення (каренція)

Для непродуктивних тварин не визначають.

5.12 Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу

При роботі з нашийником дотримуватися основних правил гігієни та безпеки, прийнятих при роботі з ветеринарними препаратами.

Відкривати упакування з нашийником безпосередньо перед використанням. При підвищенні індивідуальній чутливості власника тварини до пропоксуре (ДР) уникати контакту з нашийником.

Одягати нашийник тварині лише у гумових рукавицях. Після маніпуляцій з нашийником ретельно вимити руки. Тварин з нашийником не підпускати до маленьких дітей.

Під час фіксації нашийника тварині, не можна палити, пити, приймати їжу.

Вагітні жінки (третій триместр) повинні уникати контакту з нашийником.

6. Фармацевтичні особливості

6.1 Форми несумісності (основні)

Невідомі.

6.2 Термін придатності

5 років.

6.3 Особливі заходи зберігання

Зберігають в упакуванні виробника у сухому, недоступному для дітей та тварин, місці окремо від кормів та продуктів при температурі від 0 до 30 °C.

6.4 Природа і склад контейнера первинного пакування

Поліхлорвінілова стрічка:

для великих собак - нашийник довжиною 66 см (вага 45 г) і вмістом пропоксуре 4,442 г;

для котів та малих собак – нашийник довжиною 35 см, (вага 12,5 г) і вмістом пропоксуре 1,23 г.

Кожен нашийник загорнутий в алюмінієву фольгу і запакований у картонну коробку.

6.5 Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним препаратом або із його залишками

Невикористаний або протермінований препарат та упакування утилізують відповідно до чинного законодавства.

Діюча речовина нашийника, пропоксур, небезпечна для риби та водних організмів, тому потрібно запобігати попаданню залишків нашийника у водойми.

21.12.2022

7. Назва і місце знаходження власника реєстраційного посвідчення

Еланко ГмбХ
Хайнц-Ломанн-Штр. 4,
27472 Куксхafen, Німеччина

Elanco GmbH
Heinz-Lohmann-Str. 4,
27472 Cuxhaven, Germany

8. Назва і місце знаходження виробника

КВП Фарма і Ветеринар-Продукт ГмбХ
Проєндорфер стр. 324,
24106 Кіль, Німеччина

KVP Pharma + Veterinar-Product GmbH
Projensdorfer Str. 324,
24106 Kiel, Germany

9. Додаткова інформація

21.12.2022

**Больфо™ нашийник
(нашийник)**
листівка–вкладка

Опис

Поліхлорвініловий нашийник жовтого кольору.

Склад

10,0 г (g) маси нашийника (поліхлорвінілова стрічка) містять діючу речовину:
пропоксур - 0,98 г (g).

Допоміжні речовини: поліхлорвінілова стрічка (дібутил адіпат, пропіленгліколь октаноат деканат, епоксидована соєва олія, стеаринова кислота, діоксид титану, гідрат оксиду заліза, оксид заліза (ІІ), оксид заліза (ІІ, ІІІ), полівінілхлорид).

Фармакологічні властивості

ATCvet QP53, ектопаразитициди, інсектициди і репеленти (QP53AE02, пропоксур)

Діюча речовина препарату, пропоксур, діє на ектопаразитів як контактна отрута, викликаючи токсичну акумуляцію нейрогормону ацетилхоліну на холінергічних нервових закінченнях, внаслідок чого наступає їх загибель (бліх, кліщів, вошей та ін.). Для ссавців пропоксур нетоксичний.

Застосування

Профілактика та лікування собак та котів при ектопаразитарних захворюваннях, викликаних блохами (*Ctenocephalides spp.*) і кліщами (*Ixodidae ricinus*).

Дозування

На тварину застосовують один нашийник. Відкривають упакування, нашийник розгортають, видаляють тонкі пластикові перегородки на внутрішній стороні і фіксують на шиї тварини таким чином, щоб між шисю та нашийником залишався невеликий проміжок (у два пальці). Нашийник повинен бути вільним на шиї і не стримувати росту тварини. Підігнаний належним чином нашийник у закріпленному стані повинен вільно рухатися. У перші кілька днів перевіряйте стан шкіри тварини в області шиї і чи нашийник правильно зафікований (чи не за туго закріплений). Для великих собак – нашийник довжиною 66 см (вага 45г) і вмістом пропоксуру 4,442 г. Для котів та малих собак – нашийник довжиною 35 см (вага 12,5 г) і вмістом пропоксуру 1,23 г.

Постійне використання нашийника забезпечує захист тварини від бліх до 4 місяців, від кліщів до - 10 тижнів.

Ефективність дії нашийника та тривалість захисту залежать від довжини та стану шерсті, інтенсивності інвазії. Тварин зі скуювджею та брудною шерстю перед застосуванням нашийника купають із шампунем. Рекомендують періодично обробляти підстилки та засоби догляду за тваринами інсектицидним аерозолем **Больфо™**.

Больфо™ нашийник застосовують тваринам з 3 місячного віку.

Протипоказання

Не застосовувати хворим і ослабленим тваринам, а також тваринам чутливим до складників препарату!

Не застосовувати тваринам із захворюваннями шкіри та ушкодженнями шкірного покриву!

Не застосовувати кошенятам на цуценятам до 3 місячного віку!

Застереження

Не використовувати нашийник самкам в останні тижні вагітності та під час лактації!

Відкривати упакування з нашийником безпосередньо перед використанням. При підвищенні індивідуальній чутливості власника тварини до пропоксуру (ДР) уникати контакту з нашийником. Одягати нашийник тварині ліпше у гумових рукавицях. Після маніпуляцій з нашийником ретельно вимити руки. Тварин з нашийником не підпускати до маленьких дітей.

Під час фіксації нашийника тварині, не можна палити, пити, приймати їжу.

Вагітні жінки (третій триместр) повинні уникати контакту з нашийником.

21.12.2022

Форма випуску

Поліхлорвінілова стрічка:

для великих собак - нашийник довжиною 66 см (вага 45 г) і вмістом пропоксуру 4,442 г;

для котів та малих собак – нашийник довжиною 35 см, (вага 12,5 г) і вмістом пропоксуру 1,23 г.

Кожен нашийник загорнутий в алюмінієву фольгу і запакований у картонну коробку.

Зберігання

Зберігають в упакуванні виробника у сухому, недоступному для дітей та тварин, місці окремо від кормів та продуктів при температурі від 0 до 30 °C.

Термін придатності

5 років.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Власник реєстраційного посвідчення

Еланко ГмбХ

Хайнц-Ломан-Штр. 4,

27472 Куксхafen, Німеччина

Виробник готового продукту

КВП Фарма і Ветеринар-Продукт ГмбХ

Проендорфер стр. 324,

24106 Кіль, Німеччина

Elanco GmbH

Heinz-Lohmann-Str. 4,

27472 Cuxhaven, Germany

KVP Pharma + Veterinar-Product GmbH

Projensdorfer Str. 324,

24106 Kiel, Germany

21.12.2022



Продовження додатку 3
до реєстраційного посвідчення АА-01005-03-10

21.12.2022

